



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

من ٢٠٢٤/٩/١ حتى ٢٠٢٥/٥/٢٢ موسم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

الصفة																	الصفة
جزء ٩٨	جزء ٩٨ Propagation	جزء ٩٥ propagation	جزء ٩٥	سوبر جزء ٩٧ Propagation	سوبر جزء ٩٧	سوبر جزء ٨٦	super Giza ^{٨٦} BIO	super Giza ^{٨٦} propagation	super Giza ^{٨٦} Bci	super Giza ^{٨٦} Bci propagation	super Giza ^{٨٦} propagation Bio	سوبر جزء ٩٤ Bci	سوبر جزء ٩٤ BIO propagation	سوبر جزء ٩٤ BIO	سوبر جزء ٩٤ propagation	سوبر جزء ٩٤	
٤.٠٣	٤.٠٤	٣.٧٢	٣.٦٦	٣.٦٩	٣.٧٣	٤.٥٥	٤.٥٢	٤.٦٤	٤.٦٣	٤.٤٧	٤.٢٩	٣.٩١	٣.٥٣	٣.٢١	٣.٥٩	٣.٧٠	قراءة الميكرونير (ميكروجرام/بوصة)
٣٠.٧٩	٣٠.٣٤	٢٩.٨٦	٢٩.٨٢	٣٣.٧١	٣٣.٧١	٣٣.١٧	٣٢.٩١	٣٣.٦٧	٣٣.١٧	٣٣.٩٣	٣٤.١٦	٣٤.٣٠	٣٤.٦٢	٣٤.١١	٣٤.٧٩	٣٤.٤٠	متوسط طول النصف العلوي (مم)
٨٤.٦	٨٣.٨	٨٣.٥	٨٣.٢	٨٦.٠	٨٦	٨٦.٢	٨٥.٥	٨٧.١	٨٦.٦	٨٦.٨	٨٦.٦	٨٦.١	٨٥.٨	٨٦.٢	٨٦.٩	٨٦.٦	نسبة الانتظام (%)
٧.٣	٧.٢	٧.٨	٨.١	٦.١	٥.٩	٥.٩	٦.٠	٥.٦	٦.١	٥.٥	٥.٥	٥.٧	٥.٥	٥.٦	٥.٥	٥.٦	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٣٥.٣	٣٥.٢	٣٦.٢	٣٥.٩	٤٢.١	٤٢.٩	٤٣.٦	٤٢.١	٤٤.٧	٤٤.٠	٤٥.٥	٤٨.٠	٤٠.٧	٣٩.٥	٤١.١	٤١.٤	٤٠.٩	المتالة (جم/كس)
٦٧.٥	٦٦.٣	٦٨.٢	٦٨.٦	٧٥.٠	٧٥.٢	٧٤.٣	٧٣.٤	٧٤.٧	٧٣.٥	٧٥.٢	٧٤.٩	٧٥.٠	٧٨.٦	٧٤.٢	٧٥.٨	٧٥.٢	درجة الانعكاس Rd
١٢.٣	١١.٩	١١.٣	١١.٤	٨.٨	٨.٩	٩.٠	٩.٣	٨.٦	٨.٩	٨.٤	٨.٨	٨.٩	٨.٩	٩.١	٨.٨	٨.٩	درجة الإصفرار b+
١٦٠	١٥٤	١٥٨	١٥٦	١٩٩	٢٠٠	١٩٤	١٨٦	٢٠٢	١٩٦	٢٠٥	٢١٤	١٩٤	١٩٦	٢٠١	٢٠٤	١٩٩	ثابت الغزل
٨٤	٨٤	٨٠	٧٩	٧٨	٧٩	٨٦	٨٦	٨٨	٨٨			٧٨			٧٦	٧٧	النسبة المئوية للنضج
١٥٤	١٥٣	١٤٩	١٤٨	١٤٧	١٤٩	١٦٦	١٦٦	١٦٨	١٦٧			١٤٨			١٤٦	١٤٧	التعومة الوزنية
٣.٢	٣.٦	٤.١	٣.٩	٣.٥	٣.٣	٣.٤	٣.٧	٣.٤	٣.٤	٣.٦		٣.٤			٣.٥	٣.٦	نسبة الشوائب %
١٥٤	٢٠١	١٨٤	١٧٦	٢٠٥	١٧٩	١٣٩	١٥٩	١٤٢	١٣٠	٩٧		١٨٣			٢١٠	١٩٧	عدد العقد/جرام
٧	٩	٧٧	٣١٩	٤٠	٧٥	٣٣٥	٥	٥٦	١٩	٣	١	٩١	١	١	١٢٨	١٥٣٥	عدد العينات