



## الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

٢٠٢٤/٩/١ من حتى ٢٠٢٥/٤/٢٥ موسم ٢٠٢٤

الأصناف للأقطان المصرية												الصنف
٩٧ Reel Cotton propagation	٩٨BCI propagation	٩٩ استرا جيزة propagation	٩٩ استرا جيزة Propagation	٩٩ استرا جيزة BIO-CO Propagation	٩٩ استرا جيزة BCI	٩٩ استرا جيزة BCI	٩٩ استرا جيزة propagation	٩٩ استرا جيزة propagation	٩٩ استرا جيزة ٩٣	٩٩ استرا جيزة ٩٣	٩٩ استرا جيزة ٩٥	
٣٩٣	٣٧١	٣٧٦	٣٧١	٣٦٦	٣٤٤	٣٩٧	٣٨٥	٣٨٥	٣٨٢	٣٥٠	٣٣٨	فراغة الميكروبرين (ميکروبرام بوصة)
٣٥٥٠	٣٣٩٩	٣٤٤٢	٣٣٩٩	٣٣٩٣	٣٤٢٢	٣٦٤٧	٣٦٣٣	٣٦٤٢	٣٧١٤	٣٦٥٩	٣٥٩٩	متوسط طول النصف العلوي (مم)
٨٨٧	٨٧٤	٨٧٩	٨٨٠	٨٧٢	٨٨٧	٨٧٨	٨٧٦	٨٧٨	٨٧٧	٨٨١	٨٧٧	نسبة الإنظام (%)
٥٤	٥٦	٥٥	٥٥	٥٧	٥٥	٥٤	٥٤	٥٤	٥٤	٥٤	٥٤	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٤٦٦	٤٦١	٤٦٦	٤٦٤	٤٦٤	٤٧١	٤٥٣	٤٥٣	٤٥٤	٤٤٨	٤٣٤	٤٣٦	المائة (جم/لكن)
٧٩٢	٧٩٨	٧٨٣	٧٨٠	٧٦٩	٧٦٩	٧٥٣	٧٤٨	٧٦٥	٧٦٤	٧٤٢	٧٤٥	Rd درجة الإحكام
٨٥	٨٤	٨٤	٨٤	٨٤	٨٢	٨٦	٨٨	٨٧	١٠٩	٨٣	٨٦	b+ درجة الإسفار
٢٢٨	٢١٨	٢٢٣	٢٢٤	٢١٨	٢٣٠	٢١٩	٢١٨	٢٢١	٢٢٢	٢١٩	٢١٨	ثبات الغزل
٨٦	٨٢	٨٢	٨٣	٨٣		٨٣	٨١		٧٠	٨٦	٨٥	النسبة المئوية للتضخم
١٤٧	١٤١	١٤٢	١٤٣	١٤٣		١٥٢	١٥٠		١٢٩	١٢٦	١٢٤	النوعمة الوزنية
	٣٣	٣٢	٣٤	٣٤		٣٤	٣٢			٣١	٣٧	% نسبة الشوائب
	١٨٤	١٥٥	١٥٦	١٦٦		١٦١	١٧٩		٢١٠	١٣٦	٢١٣	عدد العد /جرام
٢	٩٩	١٨	٤	٦١	٣	٥٧	١٤٧	٤٨	٧	٢	٣	عدد العينات

ملاحظة : الاختبار حسب نظام USDA mode