



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

٢٠٢٦-٢٠٢٥ موسم الفترة من ١/٩/٢٥ الى ١/٢٢

الصنف	الصفة	بيانات المحاصيل																			
		جذرة propagation	extra G ^{٩٤} bci propagation	أكسترا جذرة ٩٢	أكسترا جذرة ٩٢BCI	sup G ^{٩٤} regen agri	supG ^{٩٧}	G ^{٩٥} Bci propagation	Giza ^{٩٥} Bci	٩٥ جذرة	sup G ^{٩٧} propagation	سوبر جذرة ٨٦BCI propagation	سوبر جذرة ٨٦BCI	سوبر جذرة ٨٦BCI	سوبر جذرة ٩٨	جذرة ٩٨	سوبر جذرة ٩٤	سوبر جذرة ٩٤ Bci	super Giza ^{٩٨} propagation	super G ^{٩٤} propagation	سوبر جذرة ٩٤ propagation
٤٠١٠	قراءة الميكرونيزير (ميكروجرام/بوصة)	٣٠٧٨	٣٠٩	٤٠٠	٤٠٣٣	٤٠١٩	٤٠١٥	٤٠٢٦	٤٠٢٢	٤٠١٤	٤٠٦٩	٤٠٧٥	٤٠٨١	٤	٤٠٢٢	٤٠٢٩	٤٠٨٢	٤٠١١	٤٠١١		
٢٩٠٥٨	متوسط طول النصف الطولي (%)	٣٤٠٥	٣٤٠٥٨	٣٤٠٧٤	٣٤٠٧٧	٣٤٠٨	٢٩٠٤٨	٢٩٠٩٢	٢٩٠٣١	٣٣٠٧٨	٣٤٠١٢	٣٤٠٢	٣٣٠٧٧	٣٠٠٧٧	٣٤٠٧١	٣٤٠٨٧	٣٣٠٩	٣٤٠٩٦	٣٥٠٠١		
٨٢٠٩	نسبة الانتظام (%)	٨٧٠٤	٨٧٠١	٨٧٠١	٨٦٠٩	٨٦٠٦	٨٢٠٩	٨٣٠١	٨٢٠٨	٨٦٠١	٨٦٠٩	٨٦٠٧	٨٦٠٧	٨٣٠٦	٨٧	٨٧٠٦	٨٦٠٦	٨٧٠٤	٨٧٠٥		
٨٠٥	نسبة الشعارات القصيرة (%)	٥٠٥	٥٠٧	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٩	٨٠٥	٨٠٣	٨٠٦	٦	٥٠٨	٦٠٠	٦	٨٠٤	٥٠٧	٥٠٦	٥٠٩	٥٠٥	٥٠٥		
٣٥٠٧	المطالبة (جم/لتر)	٤٥٠٤	٤٦٠٨	٤٦	٤٠٧	٤٣٠٧	٣٥٠٦	٣٦	٣٥٠١	٤١٠٦	٤٥	٤٤٠٩	٤٣٠٧	٣٥٠٩	٤١٠٣	٤١٠٥	٤٤٠٣	٤١٠٧	٤٢٠٣		
٦٧٠٩	درجة الانتعاش	٧٨٠٩	٧٨٠٥	٧٧٠٨	٧٧٠٥	٧٦٠٢	٦٩	٦٩٠٧	٦٩٠٣	٧٦٠٤	٧٤٠٤	٧٤٠٥	٧٣٠٨	٦٦٠٥	٧٥٠٨	٧٦٠٩	٧٤٠٦	٧٧٠٨	٧٧٠٥	Rd	
١١٠٨	درجة الإصفار	٨٠٧	٨٠٣	٨٠٥	٨٠٨	٩٠٠	١١٠٧	١١٠٧	١١٠٧	٨٠٩	٨٠٧	٩٠٢	٩	١٢٠٣	٨٠٩	٨٠٦	٨٠٩	٨٠٧	٨٠٨	b+	
١٥٠	ثبات الغزل	٢١٨	٢١٩	٢١٦	١٩٦	٢٠٣	١٥٠	١٥٢	١٤٧	١٩٤	٢٠٢	٢٠١	١٩٥	١٥٦	١٩٨	٢٠٢	١٩٧	٢٠٤	٢٠٦		
٨٣	النسبة المئوية للنضج		٨٢	٨٣			٨٣	٨٧	٨٥	٨١	٨٨		٨٨	٨٢	٨٤	٨٤	٨٨	٨١	٨٢		
١٥٣	النوعية الوزنية		١٤٢	١٤٣		١٥٣	١٥٦	١٥٥	١٥١	١٦٨		١٦٧	١٥١	١٥٣	١٥٤	١٦٧	١٥١	١٥٢			
٤٠٤	نسبة الشوائب (%)		٣٠٤	٣٠٢			٤٠٨	٥٠١	٤٠٥	٣٠٢	٣٠٣		٣٠٦	٤٠٥	٣٠٧	٣٠٣	٣٠٨	٣٠٣	٣٠٦	%	
١٦٩	عدد العقد/جرام		١٨٤	١٧٩		١٨٨	١٤١	١٥٥	١٨٤	١٢٠		١٤٨	١٨٦	١٨٠	١٤٢	١٤٧	٢١٨	١٧٩			
٢٧	عدد العينات		٥	١٦	١٤	١٧	٧٢	١٩	٤٥	١٧٦	٤٥	١٣	٨	١١٠	٥٢	٩٥٢	٢٦	٣٨	٨٨	٥٠	

رئيس مجلس الادارة

محمد عبد الحفيظ

ملاحظة : الاختبار حسب نظام USDA mode